

トレチノインクリーム ご使用方法と注意点について

千川さくら皮フ科クリニック

〒171-0043

東京都豊島区要町 3-39-5 AGILIA 千川駅前 2F

Tel: 03 - 3530-3001

トレチノイン(ビタミン A 誘導体)クリームには**皮膚のターン** オーバーを促して新しい皮膚を再生させる生理活性作用があり、ニキビやニキビ跡・シミ・色素沈着・小じわといった様々な肌トラブルに対する効果が期待できます。その反面、使用方法や量を誤るとシミを作る原因となったり、新たな皮膚のトラブルを引き起こす恐れもあります。

治療に際しては、**塗布期間や方法を必ずお守りいただき、自己 責任の基にご使用ください**ますようお願い申し上げます。





≪使用上のご注意≫

- ○トレチノインクリームは配合物質の安定性がデリケートな薬剤です。 冷蔵保存のうえ、ご購入から1ヶ月以内に使い切ってください。
- ○新たなシミや色素沈着ができるのを防ぐ為、<u>日中は必ず日焼け止めを</u> 使用してください。
- 〇トレチノインクリームの使用を続けるうちに患部が発赤して表皮が 剥けたり、痛みが出現することがありますが、治療経過として現れる 症状ですので心配は要りません。我慢できる範囲でしたら、そのまま 使用を続けると徐々に効果が表れ新しい皮膚が再生します。我慢でき ない場合は、**塗布日数を減らして調整(2 日に 1 回など)**してくださ い。使用を控えると徐々に赤みは引いていきます。
- 〇トレチノインに含まれるビタミン A には、多量摂取した場合に催奇 形性の可能性があります。妊娠中、またはその可能性のある方、授乳 中の方は使用を控えてください。
- ○効果が十分に得られているか、皮膚トラブルなく安全に使用できているかを、4週間に1度の定期診察が必要となります。

≪ご使用方法≫



朝のお手入れ

- ① 普段通り洗顔し、お手持ちの**化粧水・美容液・乳液**を使用して下さい。
- ② <u>患部にのみ</u>ハイドロキノンクリームを塗ります。 この時、患部以外に塗り広げないよう注意してください。
- ③ お肌にクリームが浸透するまで20~30分置きます。
- ④ **日焼け止め**を顔全体にしっかり塗布してから、普段通りのメイクをなさってください。

夜のお手入れ

- ① **クレンジング剤**でメイク汚れを落とし、**洗顔料**(優しく泡立てた 石鹸や洗顔フォームなど)で洗顔し、お手持ちの**化粧水・美容液・乳液**を使用して下さい。
- ② <u>患部にのみ</u>トレチノインクリームを薄く塗ります。 そのあと、ハイドロキノンクリームを重ね塗りします。 この時、クリームを患部以外に塗り広げないよう注意してください。
- ※まずは夜のみ 2 剤塗布することをお勧めします。より効果をお求めの方は、ハイドロキノンのみ朝も塗っていただいて構いません。 医師が十分な効果があると判断した場合、トレチノイン療法は1ターン(3~4か月)で終了となります。